

Serviço de Informação Diária

Foto: Milho 2ª safra em São Jerônimo da Serra Pr – Paulo R.A. Miléo




Edição e Publicação:
SEAB/DERAL



12/04/2021

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Apucarana

Na última semana o tempo permaneceu firme, sem ocorrência de chuvas. De acordo com o Simepar, podem ocorrer precipitações isoladas nos próximos dias.

A colheita do soja foi finalizada. Em relação ao milho 1ª safra, restam poucas áreas a serem colhidas. Estima-se que essas culturas de verão devem fechar com rendimentos dentro do intervalo inicialmente estimado, porém o soja com média inferior a obtida na última safra.

O milho 2ª safra segue em desenvolvimento vegetativo. Algumas lavouras começam a sentir os efeitos do prolongamento do período sem chuvas abrangentes na região, somadas com as altas temperaturas.

O plantio do trigo, principal cultura de inverno da região, deve iniciar nos próximos dias conforme as condições climáticas forem favoráveis. Estima-se que haverá pequena redução da área plantada em relação a última safra.

Cascavel

Região em estado de apreensão com a falta de chuva. Na tarde/noite de ontem, alguns município, próximos a Medianeira e Lago de Itaipu tiveram registro de chuva em áreas isoladas, com precipitação entre 7 e 25 mm. Demais municípios sem registro de chuva. Este cenário aponta para redução na produção do milho e feijão segunda safra, ambas as culturas com percentual significativo de área com definição reprodutiva. Mesmo onde registrou chuva ontem (domingo), na maioria das áreas o volume foi insignificante para resolver o déficit hídrico.

Quanto às pragas, a situação também é irregular. Maioria dos municípios com infestação de baixa a alta intensidade, seja na cigarrinha e/ou lagarta. O trigo, que tem seu zoneamento a partir de 21/4 (apenas Nova Aurora que iniciou em 01/04), em função da falta de previsão de boa chuva, os produtores que tem a tradição de plantio fora do zoneamento, não tem efetuado a semeadura no pó, insignificante são as áreas já plantadas.

Manhã desta segunda-feira com tempo encoberto, porém com pouca previsão de chuva.

Equipe técnica: Jovir Vicentini Esser

Estagiária: Pamela Zuniga

Curitiba

Semana anterior com sol na maior parte do período, com ocorrências de chuvas localizadas de baixa intensidade, variando entre 03 mm e 7mm.

-Soja: ultrapassando os 90% colhidos em alguns municípios da nossa região, com a produtividade variando muito. Aguardamos o término da colheita para melhor avaliar a média projetada .

-Feijão (segunda safra): a maioria das lavouras estão boas até o momento, salvo algumas regiões que o plantio foi tardio e foram prejudicadas pela falta de umidade.

- Milho: a colheita está mais lenta. Os produtores estão priorizando a colheita da soja e a classificação do fumo, ficando o milho para o final. A produtividade esta boa dentro do prognóstico

Hoje o dia amanheceu com sol e temperatura agradável. As colheitas devem transcorrer normalmente durante o período. A previsão é de uma semana sem chuva.

Equipe técnica: Antônio Carlos Tonon, Edson Roberto Kupka, José Alberto Grobe, Marcelo da Silva Gomes e Márcio Garcia Jacometti.

Umuarama

A semana começa com sol pleno e temperaturas que podem variar entre 20°C a 32°C, com pequena possibilidade de chuvas para esta terça-feira (13). A região de Umuarama está há praticamente 40 dias sem ocorrência de chuvas. A última chuva considerável foi no dia 04/03, com 92 mm. Para o mês de abril a média mensal é de 118 mm, sendo que para este ano, até o momento, foi zero. Diante deste cenário, é grande a preocupação dos produtores de milho de inverno, principalmente nos solos arenosos onde houve o grande aumento de área nesta safra, motivada pelos preços elevados. Já podemos contabilizar a quebra na produção regional e se persistir a seca os prejuízos serão maiores.

As pastagens que estavam muito boas até o mês de março começam a ficar escassas e secas, exigindo planejamento dos pecuaristas para atravessarem o inverno. Os preços do boi gordo continuam em alta, estimulando os produtores manterem seus rebanhos prontos para o abate.

Equipe técnica: Ático Luiz Ferreira, Alene Catarina Pacheco, Elcio Fernandes e Antônio Carlos Favaro.

Atualizações DERAL


Conjuntura - Boletim Semanal 14/2021

Acesse: <https://bit.ly/3dbvd0c>

Palavra do meteorologista

Paulo Ricardo Bardou Barbieri – Atualizado às 08 h 00 min

Nesta segunda-feira, a instabilidade atmosférica aumenta nas regiões paranaenses devido a uma frente fria que se desloca pelo oceano. Pancadas de chuvas isoladas são esperadas para o final da manhã/tarde com acumulados mais significativos ocorrendo entre as regiões noroeste e norte do estado. As temperaturas seguem elevadas entre as regiões oeste, noroeste e norte do estado, nas regiões centro-sul, Campos Gerais e o leste, as temperaturas ficam mais amenas em relação ao dia de ontem.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 24h

Nesta segunda-feira, a instabilidade atmosférica aumenta nas regiões paranaenses devido a uma frente fria que se desloca pelo oceano. Pancadas de chuvas isoladas são esperadas para o final da manhã/tarde com acumulados mais significativos ocorrendo entre as regiões noroeste e norte do estado. As temperaturas seguem elevadas entre as regiões oeste, noroeste e norte do estado, nas regiões centro-sul, Campos Gerais e o leste, as temperaturas ficam mais amenas em relação ao dia de ontem.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Na terça-feira, o eixo mais instável da frente fria se afasta em direção à Região Sudeste do País. Porém, no Paraná, as condições ainda são de instabilidade, assim, pancadas de chuvas isoladas deverão ser registradas nas diversas regiões a partir do período da tarde. As temperaturas seguem elevadas entre as regiões oeste e noroeste do estado.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Boletim Agropecuário destaca início da colheita do feijão no Paraná

A semana foi marcada pelo começo da colheita do feijão da segunda safra no Paraná. Se o clima colaborar, a produção pode atingir 491,2 mil toneladas, volume 83% superior ao da safra passada. A área, estimada em 251,2 mil hectares, é 12% superior. Os dados são do Boletim de Conjuntura Agropecuária elaborado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, referente à semana de 2 a 9 de abril.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br

Deu na Mídia

Milho abre a segunda-feira subindo nas Bolsas

Acesse: <https://bit.ly/2QkhjiZ>

Baixa oferta de boiadas para abate ditando o rumo do mercado do boi gordo

Acesse: <https://bit.ly/326RIIT>