



Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB Departamento de Economia Rural - DERAL

CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

15 a 21 de setembro de 2026

Nos dias 15 e 16, predominou tempo mais estável e seco, com temperaturas baixas principalmente no Sul, Centro-Sul e Campos Gerais. A partir da quinta-feira (17), a nebulosidade e as instabilidades aumentaram, com avanço das chuvas pelo estado. No final de semana, ocorreram chuvas em diversas regiões, acompanhadas de possibilidade de temporais, raios, granizo e rajadas de vento, enquanto as temperaturas se elevaram principalmente no Norte, Noroeste e Oeste. Na segunda-feira (21), a aproximação de uma frente fria voltou a intensificar as instabilidades, com chuvas fortes e temporais, especialmente no Oeste, Noroeste e Sul do Paraná.



15/09	16/09	17/09	18/09	19/09	20/09	21/09
Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira

Plantio, colheita e situação de lavouras selecionadas referentes ao dia **21/09/2026**

CULTURA	ÁREA*		CONDIÇÃO*			FENOLOGIA*					
	Safra	Plantio	Colheita	Ruim	Média	Boa	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
(%)											
Safra 2026/27											
	Batata (1ª safra)	47	-	-	20	80	44	56	-	-	-
	Feijão (1ª safra)	18	-	-	8	92	61	39	-	-	-
	Milho (1ª safra)	56	-	-	6	94	35	65	-	-	-
	Soja (1ª safra)	15	-	-	-	100	90	10	-	-	-
Safra 2025/26											
	Batata (2ª safra)	100	98	-	-	100	-	-	-	80	20
	Café	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cevada	100	8	-	25	75	-	2	22	53	23
	Milho (2ª safra)	100	98	-	10	90	-	-	-	-	100
	Trigo	100	46	7	29	64	-	2	9	29	60

Observação: Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "0" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.

ÁREA CULTIVADA E PLANTIO DO MILHO 1ª SAFRA



Arroz irrigado

O plantio do arroz irrigado foi prejudicado pelo excesso de chuvas, devendo ser retomado assim que houver condições adequadas para a continuidade das operações.

Aveia

A colheita das aveias segue condicionada às condições climáticas. Em algumas áreas, a aveia-branca apresenta produtividade dentro da faixa observada no período, enquanto a aveia-preta também aguarda melhores condições para a continuidade da colheita. Em parte do estado, o excesso de umidade mantém as operações mais lentas.

As informações a seguir foram compiladas de relatórios encaminhados ao longo da semana pelos funcionários lotados em Núcleos Regionais de todas as regiões do Paraná.



Batata

O excesso de umidade interrompeu temporariamente o plantio e a colheita da batata em algumas regiões, com retomada gradual após a melhora do tempo. Na região de maior produção de grãos, os produtores aguardam melhores condições de umidade do solo para intensificar o plantio da batata de 1ª safra, enquanto em lugares pontuais, as chuvas voltaram a paralisar temporariamente a colheita da batata de 2ª safra, já em fase avançada.

Café

O café encontra-se, em algumas áreas mais adiantadas, em fase de floração e frutificação, enquanto em outras regiões são realizados tratos culturais para manutenção das condições fitossanitárias e do desenvolvimento vegetativo. A colheita, recém finalizada, gerou aumento da oferta, que vêm sendo acompanhada por leve redução dos preços.

Cana-de-açúcar

A colheita da cana-de-açúcar segue em andamento conforme a disponibilidade de condições climáticas favoráveis. Em algumas áreas, também estão sendo realizados tratos culturais com o objetivo de manter o desenvolvimento das lavouras e o potencial produtivo.

Cevada

As lavouras de cevada permanecem em fase reprodutiva em algumas regiões. O excesso de chuvas e a baixa incidência de radiação solar têm prejudicado o desenvolvimento e favorecido a ocorrência de doenças e acamamento em parte das culturas de inverno.

Feijão

O plantio do feijão segue em andamento,

favorecido pela melhoria da umidade do solo proporcionada pelas chuvas, com expectativa de conclusão nas próximas semanas. Em algumas regiões, as atividades de plantio e os preparos de solo foram retomados após a redução da umidade excessiva.

Hortaliças

As hortaliças foram afetadas pelo excesso de chuvas, sobretudo em áreas de cultivo a campo. Foram observados amarelecimento das folhas, danos ao sistema radicular, murcha e perdas de plantas, com ocorrência mais expressiva em alface, almeirão, agrião, brócolis, couve-flor e repolho, em pontos isolados, houve alagamento de áreas cultivadas. Os impactos foram menores em locais com boa drenagem, onde alguns produtores conseguiram antecipar parte da colheita e da comercialização. Persistem, contudo, atrasos no plantio e no manejo e perdas de qualidade dos produtos. A disponibilidade de água em rios, riachos e represas também contribui para a manutenção de sistemas de irrigação utilizados na produção.

Mandioca

A colheita da mandioca segue dentro do ritmo esperado em diferentes regiões, assim como o plantio da próxima safra. As condições de umidade do solo têm favorecido a implantação das lavouras. As perspectivas de redução da área cultivada vêm sendo confirmadas, embora a presença de áreas de cultivo de dois ciclos mantenha volume relevante de produção a ser colhido em 2027, de modo que os efeitos mais expressivos da redução da área deverão ocorrer posteriormente.

Milho

O milho apresenta avanço no plantio da safra de verão, embora o ritmo tenha sido afetado pelas chuvas e pela elevada umidade do solo em parte do estado. Com a abertura de janelas de tempo firme, a semeadura foi acelerada e, em algumas regiões, encontra-se próxima da conclusão, enquanto lavouras já implantadas apresentam bom desenvolvimento vegetativo. A colheita do milho de 2ª safra segue em fase final em diversas áreas, mas foi temporariamente interrompida pelas chuvas em localidades onde ainda havia lavouras a campo. A retomada das operações depende da redução da umidade e de condições adequadas de trafegabilidade.

Pastagens

As pastagens apresentam boas condições de desenvolvimento, favorecidas pelas precipitações recentes, com adequada produção e disponibilidade de massa verde para a alimentação dos rebanhos de corte e leite.

Criação de gado no coxo em Sapopema, por Paulo Mileo



Soja

A semeadura da soja foi iniciada em diferentes regiões após o término do vazio sanitário, mas permanece com ritmo variável devido ao excesso de chuvas e à elevada umidade do solo. Em algumas áreas, o plantio avançou rapidamente com a abertura de períodos de tempo firme, e as primeiras lavouras emergidas apresentam boas condições. A previsão de novas precipitações tem levado os produtores a aproveitar as janelas operacionais disponíveis. Em determinadas regiões, a comercialização antecipada também foi estimulada pela valorização recente das cotações, embora parte dos produtores esteja aguardando novas oportunidades de mercado.

Tabaco

O transplante de tabaco foi favorecido pelas condições de umidade, permitindo a continuidade das operações de implantação da cultura.

Trigo

A colheita do trigo avança para a finalização, mas permanece condicionada às janelas de tempo firme. O excesso de chuvas e a alternância entre períodos úmidos e de sol aumentam o risco de perdas de qualidade e atrasos na retirada das lavouras. Em algumas áreas, foram observados danos relacionados a doenças, com destaque para brusone e giberela, além de efeitos de geadas e acamamento, resultando em redução de produtividade em parte das lavouras. Também foram relatadas manchas foliares e necessidade de tratamentos fitossanitários. A situação é mais preocupante nas áreas ainda em campo, onde novas chuvas podem ampliar as perdas.



CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

Alessandra Benatto, Aline Braz da Silva Costa, Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Ednaldo Flauzino de Lima, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Guilherme Gonçalves de Albuquerque, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Paulo Fernando de Souza Andrade, Priscila Cavalheiro Marcenovicz, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Thiago De Marchi da Silva

CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

Apucarana - Adriano Nunomura, Mikaely Berto Fernandes.

Campo Mourão - João Dimas do Nascimento, Luiz Carlos Santana; Paulo Soares Borges.

Cascavel - Bruno Henrique Comitre; Jovir Vicentini Esser; Pâmela Guimarães Zuniga.

Cianorte - Anne Caroline Testa; Jackson de Andrade dos Reis; Marcelo Manfredo Cotrin.

Cornélio Procopio - Devanir Ladeira; Graciele Moraes; Gustavo Graciola; Paulo Rogerio Abrao Mileo.

Curitiba - Edson Roberto Kupka; Marcelo da Silva Gomes.

Francisco Beltrão - Augustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Michele Menozzo; Ricardo Martyn Kaspreski.

Dois Vizinhos -

Guarapuava - Dirlei Antonio Manfio; Gustavo Alberti Drohomerecki, Josnei Augusto da Silva Pinto.

Irati - Felipe Motobayashi, Pablo Signor.

Ivaiporã - Antonio Vila Real, Sérgio Carlos Empinotti, Randolpho Oliveira.

Jacarezinho - Alexandre Lima, Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira Oliveira.

Laranjeiras do Sul - Edson Gonçalves de Oliveira; Newton Gracia da Silva; Juarez de Oliveira Andrade.

Londrina - Carlos Eduardo Boni; Clerio Valentin Damasceno Junior; Fernando Yochio Lemes Abe; Luis Morais Neto; Pedro Guglielmi Junior; William Arc Meneghel.

Maringá - Adilson Demito; Andre de Finis.

Paranaguá - Mauricio Lunardon; Sandro Henrique Gonçalves Pinto.

Paranavaí - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vitor Inacio Davies Lago.

Pato Branco - Ivano Luiz Carniel, Patricia Kifer, Sidiane Coltro Roncato.

Pitanga - Marcelo Serbai.

Ponta Grossa - Cristovam Sabino Queiroz; Luan Morosini; Luiz Alberto Vantroba.

Toledo - Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches, Marioni Cardoso, Paulo Aparecido Oliva.

Umuarama - Alene Catarina Pacheco dos Santos, Atico Luiz Ferreira; Bruno Henrique da Costa Dezotti, Elcio Fernandes.

União da Vitória - Luiz Carlos Otomaier, Vitor Aguiar de Medeiros.

Disponível em www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais