

INFORMATIVO DIÁRIO
DERAL
Departamento de Economia Rural

Data : 26/06/2000 Hora :

Título: Trigo Fonte:

Autor: Otmar Hubner

Matéria:

O frio que atingiu o estado e provocou geadas, principalmente no sul, nos dias: 22/06 e 23/06, não teve conseqüências negativa sobre as lavouras de trigo.

A maior parte do sul é abrangida pela zona G, do zoneamento agrícola, para o trigo, no qual o período recomendado para a semeadura iniciou-se em 01 de junho e vai até 10 de julho. Nas zonas: H e I, parte do sul e do sudoeste, a semeadura pode ser efetivada de 11 de junho até 20 de julho.

Graças a isso ainda não havia lavouras em fase suscetível à danos por geada. Somente a partir da fase de espigamento o trigo se torna sensível ao frio, podendo sofrer quebra de produção.

Nas demais regiões a semeadura é feita antes. No norte, a zona A, o plantio é recomendado para a partir de 21 de março e, nestas, as lavouras, gradativamente, estão atingindo as fases críticas.

Na última semana, em torno de 15% da área total do estado havia atingindo a fase de floração, concentrado principalmente no norte, contudo, nesta região não foi atingida pelas geadas.

Paralelamente permanece o clima seco no norte pioneiro, principalmente em volta de Cornélio Procópio e de Jacarezinho, aonde poderá ser computado quebra de produtividade. No restante do Paraná as chuvas têm sido suficientes para o bom desenvolvimento das lavouras, que prometem altos rendimentos.