

**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL**

**SITUAÇÃO CLIMÁTICA - SAFRA 2007/08**

Elaboração: Eng. Agr. Otmar Hubner

Data: 24 de setembro de 2007

O início do período de semeadura da safra de verão está ocorrendo em condições que preocupam os agricultores, pois, em média, tem chovido aquém do necessário para a germinação e o desenvolvimento das culturas, principalmente da 1ª safra de feijão e de o milho.

Durante agosto as precipitações acumuladas variaram de apenas um milímetro em Ivaiporã a 37 milímetros em União da Vitória, sendo que estas chuvas caíram somente entre os dias 26 e 31. Vale ressaltar que pode ter ocorrido precipitações em pontos que não dispõem de estações meteorológicas, mas, sempre em volumes baixos.

Segundo o IAPAR, o volume mínimo normal de chuvas para o Paraná, em agosto, varia de 50 a 125 milímetros, donde se vê que já é característico chover pouco durante este mês, contudo, as ocorrências atuais estão expressivamente abaixo do necessário.

Pode-se destacar que durante os últimos anos as produtividades médias têm sido boas, apesar de ter chovido menos do que as médias normais. Isto ocorreu por causa da boa distribuição das precipitações, aliado ao fato de que, na maioria, os produtores buscam seguir as recomendações técnicas, o que contribui para reduzir o risco.

Durante a primeira quinzena de setembro não foram verificadas chuvas em volume digno de nota pelas estações meteorológicas paranaenses, tendo voltado a ocorrer entre os dias 18 e 24, com o máximo acumulado de 85 milímetros em Curitiba, seguido por 36 milímetros em Guarapuava, porém nas regiões de Londrina e de Apucarana choveu apenas 2,6 e 3,0 milímetros, respectivamente. O volume mínimo normal acumulado para setembro varia de 75 a 150 milímetros.

O volume de chuvas variou de local a local dentro das diferentes regiões e, apesar dos baixos volumes, pode-se afirmar que beneficiou lavouras de trigo que ainda estão em desenvolvimento e lavouras de feijão e de milho que estão germinando ou em início de desenvolvimento, contudo, a situação mostra-se preocupante, pois para efetuar a semeadura e ter um bom resultado na safra de verão é preciso que volte a chover em volumes médios normais.