



## SITUAÇÃO PLANTIO/COLHEITA

16/01/06

As condições e as fases das culturas acompanhadas pelo DERAL se encontram assim distribuídas:

**ALGODÃO:** as condições das lavouras desta fibra encontram-se boas para cerca de 69%, sendo que 31% da área está avaliada entre ruim a regular. As fases da lavoura estão concentradas entre a floração e frutificação (81%) e na Região de Cornélio Procópio, uma pequena área já atinge a maturação.


**BATATA:** a colheita da batata das águas já atinge 76,1% da área cultivada, o que comprova uma antecipação em relação às safras anteriores, quando em 2005, era 58,8% e em 2004, 67%. As condições das lavouras a serem colhidas apresentam-se boas para 63% da área.

A estiagem está impedindo o produtor de realizar plantio da safra da seca (2ª safra). Até o momento, cerca de 15,4% da área estimada está plantada. As condições das lavouras desta safra, mesmo em fase inicial de germinação e desenvolvimento já estão sentindo a falta de água, para seu perfeito desenvolvimento.

**CEBOLA:** a colheita dos bulbos já atinge 93,1% da área, o que é considerada adiantada em relação à safra passada. Em 2005 a colheita abrangia 65,2% da área. As condições das áreas a serem colhidas não são das melhores. Cerca de 36% da área é avaliada como boa, 45% como regular e 19% em condições ruins.

**FEIJÃO:** a colheita do feijão da safra das águas já atinge 64,7% da área cultivada, demonstrando certa antecipação em relação à safra 2005, mas um pouco atrasada em relação a 2004, quando 48,9% e 69% da área já se encontravam colhida, respectivamente. As condições das lavouras são desfavoráveis para 64.253 ha, cerca de 53% da área, as quais estão sendo consideradas entre ruins a regulares.

**FEIJÃO DAS ÁGUAS: Participação (%) dos Núcleos Regionais na colheita, totalizando 64,7% no Estado**



Fonte: SEAB/DERAL

O plantio do feijão da seca (2ª safra) está um pouco atrasado em virtude da escassez de chuva. Nesta safra apenas 14,5% da área já foi semeada, em 2005, 23% e, em 2004 eram 24%. O produtor está cauteloso e deverá retornar ao plantio somente quando o solo possuir umidade suficiente para garantir uma boa germinação. Da área plantada até o momento, 31% demonstram-se em situação regular e 69% em boas condições.

**MILHO:** as condições das lavouras desta gramínea vêm sofrendo com a ausência de chuva. Até semana passada, 61% da área estava avaliada, pelos técnicos do DERAL, em boas condições. Nesta semana, este indicador aponta que são 55% em boas condições, contra 45% em condições desfavoráveis (15% ruim e 31% regulares).

A lavoura encontra-se nas seguintes fases: Desenvolvimento vegetativo (9%), floração (28%), frutificação (41%) e maturação (22%), portanto, ainda existe milho em fase inicial de desenvolvimento, as quais poderão ser beneficiadas caso ocorram chuvas imediatamente ou poderá comprometer ainda mais a produção caso não chover.

As primeiras áreas de milho desta safra já estão sendo colhidas na região Sudoeste (Francisco Beltrão e Pato Branco). São cerca de 0,8% da área (cerca de 12.000 ha), as quais foram plantadas em agosto/setembro. A produtividade obtida (4.000-4.200 kg/ha) até o momento é inferior ao esperado para a Região Sudoeste, a qual seria, em condições normais, 6.310 a 6.830 kg/ha.

**SOJA:** a soja também está sofrendo com a falta de chuva, mas em menor escala do que o milho, pois se encontra nas seguintes fases: desenvolvimento vegetativo (22%), floração (47%), frutificação (28%) e 3% em maturação. Até semana passada, as condições das lavouras eram boas para 75%. Hoje, são 65% em condições favoráveis, sendo 5% em condições ruins e 30% regular.

A colheita da soja também começou antecipadamente em relação à safra passada. As primeiras áreas colhidas são cultivares precoces, as quais foram semeadas no Núcleo Regional de Cascavel (Região Oeste), em meados de setembro. Nos 8.560 ha colhidos (0,2% da área estadual), a produtividade obtida foi de 110 sacas por alqueire paulista (2.727 kg/ha).

O quadro abaixo apresenta, percentualmente, a situação do plantio, condições e fases das lavouras da safra 05/06.

Quadro 1 – PARANÁ: ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS DA SAFRA 05/06 16 / 01 / 06

CULTURA	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA A SER COLHIDA			FASES DAS LAVOURAS, EM PERCENTAGEM (%) DA ÁREA A SER COLHIDA					PRODUÇÃO VENDIDA (%)
			RUIM	MÉDIO	BOM	GERM.	D.V.	FLOR.	FRUT.	MATU.	
Algodão	100	-	6	25	69	-	18	51	30	1	-
Batata (1ª safra)	100	76,1	6	31	63	-	3	-	36	61	68,4
Batata (2ª safra)	15,4	-	-	26	74	49	48	-	3	-	-
Cebola	100	93,1	19	45	36	-	-	-	38	62	49,9
Feijão (1ª safra)	100	64,7	11	42	47	-	7	9	35	49	35,6
Feijão (2ª safra)	14,5	-	-	31	69	40	57	3	-	-	-
Milho (1ª safra)	100	0,8	15	31	54	-	9	28	41	22	0,4
Soja (1ª safra)	100	0,2	5	30	65	-	22	47	28	3	1,5

Fonte: SEAB-DERAL

DIRLEI ANTONIO MANFIO  
Setor de Previsão de Safras