

Serviço de Informação Diária

Para acessar mais
Fotos, clique aqui



Foto: Tratos culturais em aveia no município de São Jerônimo da Serra Pr – Paulo R. A. Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

24/07/2019

Núcleos Regionais da SEAB



Nota: Para Acessar a Página do Núcleo Regional, click no link: <https://bit.ly/2DZuUEs> e no Mapa em qualquer município da jurisdição do Regional.



Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem de Núcleo Regional: <https://bit.ly/2PgA0xO>
Divisão de todos os Municípios do Estado por ordem alfabética: <https://bit.ly/2FWVW1S>

Ivaiporã

Dia de céu claro pela manhã, com temperatura de 9°C e previsão de 27°C no período da tarde, segundo o Climatempo.

O trigo, principal cultura atingida pela geada, apresenta perdas consideráveis, porém ainda em fase de avaliação. Seu estágio é de emborrachamento e floração.

O milho segunda safra está em plena colheita, com bons rendimentos, em torno de 5000 kg/ha considerado bom.

O café em fase final de colheita, foi o mais atingido pela geada, devendo ter sua próxima safra reduzida acima de 50%, sem considerar as áreas mais antigas que poderão ser erradicadas.

Laranjeiras do Sul

Manhã de céu claro e bastante calor. O tempo continua muito seco, e segundo a Somar Meteorologia, não devemos ter chuvas de forte intensidade nos próximos dias.

A colheita do milho segunda safra atingiu 50% da área total, e as produtividades até o momento são excelentes, na casa dos 5.400 kg/ha. A produtividade dessa safra é a segunda melhor da história na região, só perdendo para a safra 2014/2015, que chegou aos 5.800 kg/ha. Contribuiu muito para isso o plantio antecipado de parte das áreas, que foram semeadas em janeiro por causa da antecipação na colheita da soja, sendo que nessas áreas observamos produtividades de até 8.000 kg/ha, o que elevou a média geral.

Nas culturas de inverno existem perdas consolidadas em função das geadas, especialmente nas lavouras de aveia, e em menor intensidade no trigo. Outro fator que gera preocupação é a falta de umidade, que pode até intensificar as perdas, já que boa parte das lavouras de trigo começa entrar em fase reprodutiva.

Boletins DERAL

Estimativa de Safras - Mensal

Acesse: <http://bit.ly/2SEIKS2>


Plantio Colheita e Comercialização Mensal

Acesse: <http://bit.ly/2JOyZxE>

Boletins anteriores: *Acesse: <https://goo.gl/IFTgDv>*

Condições do Tempo 24h

Na quarta-feira continua chovendo forte no Rio Grande do Sul, devido a presença de um sistema semiestacionário. No Paraná as condições para chuvas novamente são baixas (alguma chuva bem localizada no oeste e no sudoeste apenas). No geral teremos mais um dia de tempo estável no Estado, com temperaturas elevadas. Ventos de norte seguem moderados a fortes entre o final da manhã e a tarde.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Condições do Tempo 48h

Durante a quinta-feira pouca coisa muda em relação às condições do tempo no Paraná. Há chance de chuva isolada apenas nos extremos oeste e sudoeste do Estado, áreas mais próximas de fronteira com o Paraguai e Argentina. Nas demais regiões paranaenses segue com tempo mais seco.


Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Fernando Mendonça Mendes – Atualizado às 08 h 12 min

A quarta-feira amanhece com Sol no estado e taxas de umidade mais elevadas na faixa leste e oeste. Na imagem de satélite ao lado, destaque para presença de vapor d'água na atmosfera. Nota-se que na região do Paraná, a atmosfera da região apresenta indicação de vapor d'água de concentração mais baixa, enquanto na altura do Rio Grande do Sul, os índices são elevados, com chuva na região. No centro do país, predomínio de uma massa de ar seco.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Iapar pesquisa identificação de bovinos com inteligência artificial

Pesquisas conduzidas pelo Instituto Agrônomo do Paraná (Iapar) em parceria com estudantes e professores de universidades buscam melhorar a identificação de bovinos. Para isso, está em desenvolvimento um método de identificação baseado no padrão biométrico do espelho nasal dos animais, a partir de tecnologias como inteligência artificial e algoritmos.

Acesse: <http://bit.ly/2Of0lfm>

Fonte e mais informações:

WWW.AEN.PR.GOV.BR

Deu na Mídia

Sulfoxaflor tem risco menor que outros inseticidas

Segundo a EPA, existem muitos estudos que comprovam essa segurança

Acesse: <http://bit.ly/2LD0X1C>

Anvisa vai reclassificar defensivos agrícolas que estão no mercado

Acesse: <http://bit.ly/2Oh4uVo>