

INFORMATIVO DIÁRIO  
**DERAL**  
Departamento de Economia Rural

Data : 19/02/2003 Hora :

Título: Safra de verão Fonte:

Autor: Otmar Hubner

Matéria:

O relatório semanal de acompanhamento de safra divulgado por este DERAL, indica a situação das principais lavouras da safra de verão, em 17/03/2003.

#### FEIJÃO (Eng. Agr. Gilberto Martins Bello da Silva)

Está praticamente encerrada a colheita da safra das “águas” 2002/03, permanecendo a estimativa de uma produção de 419.801 toneladas; a comercialização está lenta até o momento, cerca de 66% do produto colhido foi vendido, sendo que 37% do feijão colhido não apresenta as melhores condições devido, principalmente, ao excesso de chuvas e está sendo cotado como feijão tipo comercial.

Quanto a safra das “secas” 2002/03, a colheita dos 118.215 ha plantados já começou. Ponta Grossa, região de grande importância, é responsável por 39% da produção total; sua colheita está adiantada, sendo que os primeiros lotes colhidos são de boa qualidade.

A estimativa atual aponta para uma produção total de 173.753 toneladas, ou seja, 19% a mais que a última safra das “secas”.

#### MILHO “Safra Normal” (Eng. Agr. Otmar Hubner)

Apesar de as chuvas estarem dificultando a colheita em algumas regiões do estado, ela atingiu cerca de 16% da área amanhada, percentual este que é semelhante ao de anos anteriores, no mesmo período.

#### MILHO “Safrinha” (Eng. Agr. Otmar Hubner)

Os 24% de área semeada representam desempenho ligeiramente superior ao de anos anteriores, apesar das atividades de colheita de milho e de soja não serem plenas. Acontece que parte da área semeada até agora o foi em sucessão à lavouras de feijão da safra das águas.

#### SOJA (Eng. Agr. Otmar Hubner)

Durante a última semana a colheita da soja paranaense praticamente estacionou por causa do clima úmido imperante sobre as principais regiões produtoras.

Até 10 de fevereiro foram colhidos 2,8% da área total e agora, em 17, as operações alcançaram 3,4% da mesma.

Apesar do clima úmido estar segurando a colheita, ainda não se fala em prejuízos sobre a qualidade e a produtividade das lavouras, mesmo porque, historicamente o auge da colheita ocorre em março.

ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO DE PLANTIO/COLHEITA - \_\_\_\_\_ PARANÁ

17/02/03

PRODUTOS	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA TOTAL			FASES					VENDIDO (em %)	
			RUIM	MÉDIO	BOM	% GERM.	% DESENV. VEGETATIVO	% FLOR.	% FRUTI.	% MAT.		
SAFRA 02/03												
Batata (águas)	100	97	5	18	77	0	0	0	0	100	93	
Batata (seca)	90	0	1	20	79	26	53	6	13	2	0	
Feijão (águas)	100	99	11	25	64	0	0	0	0	100	66	
Feijão (seca)	87	4	0	9	91	18	58	11	10	3	1	
Milho (normal)	100	16	2	9	89	0	1	5	38	56	8	
Milho (safrinha)	24	0	0	6	94	37	60	2	1	0	0	
Soja	100	3	1	9	90	0	1	16	62	21	19	

ELABORAÇÃO: SEAB/DERAL - <http://www.pr.gov.br/seab>