

INFORMATIVO DIÁRIO
DERAL
Departamento de Economia Rural

Data : 31/01/2003 Hora :

Título: Safra de verão 02/03

Fonte:

Autor: Otmar Hubner

Matéria:

O relatório semanal de acompanhamento de safra divulgado por este DERAL, indica o desempenho das principais lavouras da safra de verão.

Milho

Aproximadamente 3% das lavouras de milho estavam colhidas até 24 de janeiro de 2003 e do restante das lavouras 4% encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo; 21% em floração; 45% em frutificação e 29% na fase de maturação.

De uma maneira geral, as lavouras de milho apresentam-se com bom desenvolvimento. **O clima tem sido favorável, com ocorrência de chuvas freqüentes e bem distribuídas em todo o estado. Durante o Mês de janeiro houve uma intensificação das chuvas trazendo excesso de umidade as lavouras, porém não há indicativo de quebra na safra.**

De acordo com os técnicos de campo, 87% das lavouras encontram-se em boas condições; 11% em condições regulares e 2% em condições ruins.

A colheita iniciou-se na primeira quinzena de janeiro. As lavouras mais adiantadas estão nas regiões de Apucarana, Cascavel, Fco Beltrão e Umuarama.

O relatório de safra do mês de janeiro apontou para uma estimativa de plantio 1,44 milhão de hectares, com previsão de produção de 7,34 milhões de toneladas.

Soja

As lavouras de soja encontram-se, em sua maioria, nas fases de frutificação, aproximadamente 54%; restando ainda 28% das lavouras em fase de floração; e 3% em maturação.

Cerca de 90% das lavouras encontram-se em boas condições; 9% em condições regulares e 1% em más condições.

No caso da soja, as lavouras estão mais adiantadas no Oeste do estado, onde já está sendo iniciada a colheita, porém, em percentual não significativo. A colheita dever-se-á intensificar a partir de meados de fevereiro.

A área plantada com soja no Paraná é de 3,54 milhões de hectares, com previsão de produção de 10,53 milhões de toneladas.

Feijão

A colheita das lavouras de feijão atingiu 75% da área plantada, com as lavouras ainda por colher encontrando-se nas fases de maturação 71%; frutificação 19%; floração 9% e desenvolvimento vegetativo 1%.

A cultura do feijão foi a mais prejudicada pelos problemas climáticos desde a implantação das lavouras; geadas, chuvas excessivas, baixas temperaturas e estiagem no Norte do estado, afetaram as lavouras provocando uma quebra de que gira em torno de 15 a 20% na produção.

As lavouras foram classificadas da seguinte maneira: 51% em boas condições; 37 % em condições regulares e 12% em más condições.

A área plantada com feijão no Paraná é de 410 mil hectares, com previsão de produção de 404.000 a 429.000 toneladas.

Milho Safrinha

A safrinha de milho no Sudoeste e no Centro Sul do estado já está bem adiantada, pois nestas regiões a semeadura ocorre em sucessão principalmente às lavouras de feijão e fumo. A estimativa preliminar é de um crescimento na área de 17% da safrinha .

PRODUTOS	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA TOTAL			FAS	
			RUIM	MÉDIO	BOM	% GERM.	% DESENV. VEGETATIVO
Safra 01/02							
Cevada	100	100	0	0	0	0	0
Trigo	100	100	0	0	0	0	0
Safra 02/03							
Feijão águas	100	74	12	37	51	0	1
Milho (normal)	100	3	2	11	87	0	4
Batata (águas)	100	77	2	20	78	0	0
Soja	100	0	1	9	90	0	16

ELABORAÇÃO: SEAB/DERAL/DCA - <http://www.pr.gov.br/seab>