

INFORMATIVO DIÁRIO  
**DERAL**  
Departamento de Economia Rural

Data : 08/01/2003 Hora :

Título: Acompanhamento da safra de verão Fonte:

Autor: Vera da Rocha Zardo

Matéria:

O relatório semanal de acompanhamento de safra divulgado por este DERAL, indica o desempenho das principais lavouras da safra de verão.

### **Milho**

Aproximadamente 26% das lavouras de milho encontram-se na fase de desenvolvimento vegetativo; 24% em floração; 40% em frutificação e 10% na fase de maturação.

De uma maneira geral, as lavouras de milho apresentam-se com bom desenvolvimento. O clima, com ocorrência de chuvas freqüentes e bem distribuídas em todo o estado, está beneficiando as lavouras.

De acordo com os técnicos de campo, 87% das lavouras encontram-se em boas condições; 12% em condições regulares e 1% em condições ruins.

A colheita inicia-se ainda nesta primeira quinzena de janeiro. As lavouras mais adiantadas estão nas regiões de Apucarana, Cascavel, Fco Beltrão e Umuarama.

O relatório de safra do mês de dezembro apontou para uma estimativa de plantio de 1,44 milhão de hectares com previsão de produção de 7,38 milhões de toneladas.

As lavouras de soja encontram-se, em sua maioria, nas fases de desenvolvimento vegetativo, aproximadamente 64%; restando ainda 25% das lavouras em fase de floração; 10% em frutificação e 1% em maturação.

Cerca de 89% das lavouras encontram-se em boas condições; 10% em condições regulares e 1% em más condições.

No caso da soja, as lavouras estão mais adiantadas no Oeste do estado.

A área plantada com soja no Paraná é de 3,54 milhões de hectares, com previsão de produção de 10,53 milhões de toneladas.

A colheita das lavouras de feijão atingiu 50% da área plantada com as lavouras ainda a colher encontrando-se nas fases de maturação 51%; frutificação 32%; floração 13% e desenvolvimento vegetativo 4%.

No Norte e no Oeste do estado a colheita encerrou-se. Aproximadamente 28% da produção total foi comercializada, o que representa cerca de 133 mil toneladas.

A cultura do feijão foi a mais prejudicada pelos problemas climáticos desde a implantação das lavouras; geadas, chuvas excessivas, baixas temperaturas e estiagem no Norte do estado, afetaram as lavouras provocando uma quebra de 7% na produção.

As lavouras foram classificadas da seguinte maneira: 57% em boas condições; 33 % em condições regulares e 10% em más condições.

A área plantada com feijão no Paraná é de 410 mil hectares, com previsão de produção de 471 mil toneladas.

Iniciou o plantio da safrinha de milho no Sudoeste e no Centro Sul do estado, regiões onde a semeadura ocorre em sucessão principalmente às lavouras de feijão e fumo. A estimativa preliminar é de um crescimento na área de 17% da safrinha .

PRODUTOS	% PLANTADA	% COLHIDA	CONDIÇÃO DAS LAVOURAS % DA ÁREA TOTAL			FASES			
			RUIM	MÉDIO	BOM	% GERM.	% DESENV. VEGETATIVO	% FLOR.	% FRUTI.
Safra 01/02									
Cevada	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Trigo	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Safra 02/03									
Feijão águas	100	50	10	33	57	0	4	13	32
Milho (normal)	100	0	1	12	87	0	26	24	40
Batata (águas)	100	47	1	14	85	0	2	2	29
Soja	100	0	1	10	89	0	64	25	10

ELABORAÇÃO: SEAB/DERAL/DCA - <http://www.pr.gov.br/seab>