Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB

Departamento de Economia Rural - DERAL

CONDIÇÕES DE TEMPO E CULTIVO

27 de outubro a 03 de novembro de 2026


Entre os dias 27 e 29 de outubro, o Paraná apresentou temperaturas amenas e maior nebulosidade, com chuvas fracas e isoladas em diferentes regiões. Nos dias 30 e 31, houve elevação das temperaturas, principalmente no Oeste, Norte e Noroeste, com predomínio de sol e ocorrência de pancadas de chuva isoladas. Nos dias 01 e 02 de novembro, o tempo ficou instável em grande parte do estado, com chuvas expressivas, trovoadas e temporais, especialmente nas regiões Oeste, Noroeste e Centro-Sul.

27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	01/11	02/11
Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo	Segunda-feira

Plantio, colheita e situação de lavouras selecionadas referentes ao dia **03/11/2026**

CULTURA	ÁREA*		CONDIÇÃO*			FENOLOGIA*				
Safra	Plantio	Colheita	Ruim	Média	Boa	Germinação	Desenv. Vegetativo	Floração	Frutificação	Maturação
			(%)							
Safra 2026/27										
Batata *(1ªsafra)*	81	-	2	29	69	13	54	-	30	3
Feijão *(1ª safra)*	85	-	6	28	66	14	74	8	4	0
Milho *(1ª safra)*	97	-	2	22	76	4	96	-	-	-
Soja *(1ª safra)*	71	-	1	14	85	21	76	3	0	-
Safra 2025/26										
Batata *(2ªsafra)*	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-
Cevada	100	73	10	36	54	-	-	-	8	92
Trigo	100	92	10	50	40	-	-	-	20	80

Observação: Os dados expressos com "-" representam zero absoluto; os dados expressos com "**0**" representam arredondamento de números inferiores a 0,5; dados em 100% podem representar números superiores a 99,5.



Macrorregiões da SEAB

As informações a seguir foram compiladas de relatórios encaminhados ao longo da semana pelos funcionários lotados em Núcleos Regionais de todas as regiões do Paraná.

Alfafa

As lavouras de alfafa seguem recebendo tratos culturais, visando à manutenção das condições de desenvolvimento e produção.

Arroz irrigado

O arroz irrigado enfrenta prejuízos expressivos em decorrência das enchentes provocadas pela elevação dos níveis dos rios Ivaí e Paraná. A inundação de áreas cultivadas ocasionou perdas irreversíveis, sem possibilidade de replantio em parte das lavouras, agravadas pelos elevados custos de produção e pela dificuldade de recuperação das áreas atingidas. A continuidade da atividade dependerá das condições climáticas dos próximos meses, especialmente dos volumes de chuva registrados em novembro e dezembro.

Aveia

As culturas de aveia-branca e aveia-preta estão com a colheita próxima da conclusão, apresentando, de maneira geral, baixa qualidade dos grãos e produtividade reduzida em decorrência das condições climáticas adversas durante o ciclo.

Parte da produção apresenta padrão comprometido, com destinação comercial condicionada à qualidade obtida.

Batata

O plantio da batata avançou durante os períodos de trégua das chuvas, embora permaneça atrasado em relação ao calendário inicialmente previsto. A elevada umidade do solo e as dificuldades de acesso às áreas de cultivo continuam limitando o andamento das operações.

Café

A cultura do café encontra-se em diferentes fases de desenvolvimento, com lavouras em enchimento dos grãos e áreas em floração. As precipitações recentes têm favorecido o desenvolvimento das plantas, sem registro de prejuízos significativos à floração até o momento. Os produtores seguem realizando adubações e manejos fitossanitários, com destaque para o controle da ferrugem. Também estão sendo executadas podas de frutificação e esqueletamento, visando melhorar a produtividade e a qualidade das próximas safras.

Cana-de-açúcar

A colheita da cana-de-açúcar apresenta andamento variável conforme as condições climáticas e operacionais, tendo sido temporariamente interrompida em algumas localidades em razão do excesso de chuvas. Com a abertura de janelas de tempo favorável, os trabalhos foram retomados, assim como as atividades de renovação e plantio de novas áreas, especialmente nas proximidades das usinas. Em algumas regiões, a colheita foi finalizada.

Cevada

A colheita da cevada encontra-se em estágio avançado, com resultados de produtividade abaixo das estimativas iniciais em algumas regiões. Apesar das perdas quantitativas, a qualidade dos grãos apresenta resultados positivos em parte das áreas, permitindo a classificação para uso cervejeiro. Entretanto, as instabilidades climáticas durante o ciclo, caracterizadas pelo excesso de chuvas e pela baixa luminosidade, comprometeram o desempenho da cultura em determinadas localidades.

Feijão

O plantio do feijão da 1ª safra enfrenta dificuldades em razão do excesso de chuvas e dos riscos climáticos, fatores que, associados aos custos de produção e à remuneração recebida pelos produtores, têm desestimulado a aquisição de sementes e a ampliação da área cultivada. As precipitações também provocaram perdas de plantas em áreas mais baixas, devido ao encharcamento do solo.

Hortifrutícolas

As culturas hortifrutícolas encontram-se em fase de colheita e armazenamento, com a produção destinada à comercialização nos mercados regionais. O excesso de chuvas e as dificuldades de acesso às propriedades representam fatores de atenção para a continuidade das operações agrícolas.

Mandioca

A colheita da mandioca segue conforme o planejamento em algumas regiões, enquanto em outras já foi finalizada. O plantio, que havia sido interrompido devido ao excesso de precipitações e às condições inadequadas de umidade do solo, apresenta possibilidade de retomada com a melhoria das condições de campo. Entretanto, as lavouras recém-implantadas continuam vulneráveis ao encharcamento, à erosão e aos danos provocados pelo escoamento superficial da água.

Milho

O plantio do milho de 1ª safra encontra-se em estágio avançado, com áreas praticamente concluídas em algumas regiões, enquanto em outras ainda está em andamento. As lavouras apresentam, de maneira geral, boa germinação e desenvolvimento vegetativo inicial, embora a baixa luminosidade, as temperaturas amenas e o excesso de umidade estejam provocando atraso no desenvolvimento e amarelecimento das plantas. Também há registros de ocorrência de pragas, principalmente lagartas e tripes, além de preocupação com o aumento da incidência de doenças. As chuvas intensas, os ventos fortes e episódios de granizo também representam riscos ao estabelecimento das lavouras. Paralelamente, o milho armazenado segue sendo comercializado conforme as condições do mercado agrícola.

Pastagens

As pastagens apresentam, de maneira geral, boa produção de massa verde e condições favoráveis ao desenvolvimento, proporcionando disponibilidade de alimento para os animais de grande e pequeno porte. As condições têm favorecido o manejo dos rebanhos e a continuidade das atividades pecuárias, embora os elevados volumes de precipitação exijam atenção às condições de conservação do solo e de acesso às propriedades.

Soja

A semeadura da soja avançou significativamente durante os períodos de menor precipitação, aproximando-se da conclusão em diversas regiões, embora permaneça atrasada em algumas localidades. As condições de excesso de umidade, encharcamento dos solos, baixa luminosidade e temperaturas abaixo do esperado para a época têm dificultado o acesso das máquinas às lavouras e comprometido o estabelecimento inicial das plantas. Embora parte das áreas apresente boa germinação e estande adequado, também são observadas falhas de emergência, redução da população de plantas, amarelecimento das folhas e desenvolvimento vegetativo lento ou praticamente estagnado. Os elevados volumes de chuva intensificaram os processos erosivos, provocaram rompimentos de terraços e curvas de nível e favoreceram a lixiviação de nutrientes. Episódios de vendaval e granizo também ocasionaram perdas parciais e totais em algumas lavouras. Além disso, o excesso de umidade favorece a proliferação de plantas daninhas e aumenta a incidência de pragas e doenças, enquanto as dificuldades de acesso às áreas comprometem a realização dos tratos culturais e das pulverizações dentro dos períodos recomendados. O cenário gera preocupação quanto ao potencial produtivo e poderá prolongar o ciclo da cultura, com possíveis reflexos no planejamento da segunda safra de milho.

Tabaco

As lavouras de tabaco apresentam desenvolvimento abaixo do esperado em algumas regiões, principalmente em decorrência do excesso de umidade no solo. As condições favoreceram o apodrecimento das folhas e comprometeram o vigor das plantas, ocasionando perdas na produção e perspectivas de redução do rendimento. Também foram registrados danos pontuais provocados por episódios de granizo.

Trigo

A colheita do trigo encontra-se em fase final na maior parte das regiões, com algumas áreas ainda pendentes, especialmente em localidades de maior altitude. A safra foi amplamente prejudicada pelas condições climáticas adversas ao longo do ciclo, incluindo excesso de chuvas e baixa luminosidade, ,que comprometeram tanto a produtividade quanto a qualidade dos grãos. Observa-se elevado volume de produto classificado como trigo de baixo padrão, com presença significativa de triguilho e, em algumas localidades, resíduos de trigo. As condições de umidade durante a formação das espigas e o enchimento dos grãos, associadas às dificuldades de realização dos tratos culturais e do controle fitossanitário, também favoreceram a ocorrência de doenças, como brusone, giberela e manchas foliares. Os resultados da safra poderão influenciar as decisões dos produtores quanto à área destinada aos cereais de inverno no próximo ciclo. Os grãos armazenados seguem sendo comercializados conforme as condições do mercado agrícola.

CORPO TÉCNICO DERAL - SEDE

Alessandra Benatto, Aline Braz da Silva Costa, Carlos Hugo Winckler Godinho, Edmar Wardensk Gervasio, Ednaldo Flauzino de Lima, Eliane Mara Rebelo, Fernanda Marie Yonamini, Francisco Carlos Simioni, Gianna Maria Cirio, Guilherme Gonçalves de Albuquerque, Larissa Nahirny Alves, Marcelo Garrido Moreira, Maria Clara Francisco Biazoto, Paulo Fernando de Souza Andrade, Priscila Cavalheiro Marcenovicz, Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva, Thiago De Marchi da Silva

CORPO TÉCNICO DERAL - NÚCLEOS REGIONAIS

Apucarana - Adriano Nunomura, Mikaely Berto Fernandes.
Campo Mourão - João Dimas do Nascimento, Maria Fernanda de Souza Dias; Paulo Soares Borges.
Cascavel - Bruno Henrique Comitre; Pâmela Guimarães Zuniga.
Cianorte - Anne Caroline Testa; Jackson de Andrade dos Reis; Marcelo Manfredo Cotrin.
Cornélio Procópio - Devanir Ladeira; Graciele Moraes; Gustavo Graciola; Paulo Rogerio Abrao Mileo.
Curitiba - Edson Roberto Kupka; Marcelo da Silva Gomes.
Francisco Beltrão - Augustinho Girardello; Antoninho Fontanella; Michele Menozzo; Ricardo Martyn Kaspreski.
Dois Vizinhos -
Guarapuava - Dirlei Antonio Manfio; Gustavo Alberti Drohomerecki, Josnei Augusto da Silva Pinto.
Irati - Felipe Motobayashi, Pablo Signor.
Ivaiporã - Antonio Vila Real, Sérgio Carlos Empinotti, Randolfo Oliveira.
Jacarezinho - Alexandre Lima, Franc Rom de Oliveira; Haroldo Siqueira Oliveira.
Laranjeiras do Sul - Edson Gonçalves de Oliveira; Newton Gracia da Silva; Juarez de Oliveira Andrade.
Londrina - Carlos Eduardo Boni; Clerio Valentin Damasceno Junior; Fernando Yochio Lemes Abe; Luis Morais Neto; Pedro Guglielmi Junior; William Arc Meneghel.
Maringá - Adilson Demito; Andre de Finis.
Paranaguá - Mauricio Lunardon; Sandro Henrique Gonçalves Pinto.
Paranavaí - Carlos Santos de Araujo; Enio Luiz Debarba; Vitor Inacio Davies Lago.
Pato Branco - Ivano Luiz Carniel, Patricia Kifer, Sidiane Coltro Roncato.
Pitanga - Marcelo Serbai.
Ponta Grossa - Cristovam Sabino Queiroz; Luan Morosini; Luiz Alberto Vantroba.
Toledo - Jean Marie Aparecida Ferrarini Triches, Marioni Cardoso, Paulo Aparecido Oliva.
Umuarama - Alene Catarina Pacheco dos Santos, Atico Luiz Ferreira; Bruno Henrique da Costa Dezotti, Elcio Fernandes.
União da Vitória - Luiz Carlos Otomaier, Vitor Aguiar de Medeiros.

Disponível em www.agricultura.pr.gov.br/Boletins-Informativos-Atuais