Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Limpeza manual em Cana-de-Açúcar em São Jeronimo da Serra – Paulo Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

22/12/2017

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Maringá

Hoje o dia amanheceu nublado, temperatura ao redor de 22°C e umidade relativa do ar em 98% (UEM – 08:00).

A semana iniciou com tempo firme e sol forte, porém na quarta feira, houve ocorrência de chuvas variando entre 10 mm e 32 mm nos municípios da regional, favorecendo as culturas de forma geral. Segundo o Clima Tempo há previsão de chuvas para o final de semana.

A cultura da soja segue com bom desenvolvimento vegetativo favorecida pela boa condição climática das ultimas semanas. A maioria se encontra na fase de floração e frutificação e, no geral, as lavouras estão boas. Os produtores estão realizando a primeira aplicação de fungicida e monitoramento para controle de pragas e doenças.

Os cafezais que sofreram o desfolhamento, em virtude da boa produtividade deste ano, estão apresentando boa recuperação. Os produtores estão realizando pulverizações para controle de bicho mineiro e ferrugem.

A colheita de cana de açúcar foi encerrada na região e no momento as usinas aproveitam a entressafra para efetuar manutenção preventiva das máquinas, equipamentos e indústria. As lavouras estão apresentando bom desenvolvimento vegetativo.

A colheita da uva está com cerca de 80% colhida e a da laranja 75%.

Equipe técnica: *Dorival A. Basta, Moisés Bolonhez, Ivani Marangoni e Marcelo Serbai*

Ponta Grossa

Semana toda praticamente instável, com tempo parcialmente nublado e chuvas isoladas. A partir do dia 20/12/2017 as chuvas foram mais abrangentes e de maior volume, recuperando praticamente a umidade do solo. Variaram bastante entre 14mm a 72,4mm registrados nas 25 (vinte e cinco) estações meteorológicas da Fundação ABC. No acumulado dos últimos dois dias a média foi de 37,21mm.

As chuvas trouxeram um certo alívio para os produtores, pois as principais culturas (soja, milho, feijão, etc) já estavam sofrendo com a falta de umidade no solo. Atualmente a situação é de normalidade com as estimativas iniciais de produção previstas.

As principais atividades são o monitoramento das áreas, principalmente de soja com relação a pragas e doenças, o próprio controle preventivo de doenças, principalmente ferrugem e as colheitas de feijão, fumo e batata. Ressalta-se a dificuldade dessas operações nos dois últimos dias, devendo à nebulosidade e a ocorrência de chuvas intermitentes.

Para os próximos três dias, segundo o Simepar, o tempo não muda muito, ou seja, parcialmente nublado com trovoadas e chuvas isoladas.

Equipe técnica: Carlito Pricival Jr, *Carlos Roberto Osternack, Vera Maria Silvestre e Luiz Alberto Vantroba*

Toledo

Semana que encerra marcada por chuvas em toda região. Clima bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras de soja, sobretudo, nesta fase de floração e frutificação.

Portaria da SEAB, através da ADAPAR, que autoriza plantio de soja em janeiro não deve ter efeito importante na região e muitos estranharam pelo fato de coincidir com o período de vazio sanitário.

Equipe técnica: *Paulo Aparecido Oliva, Jean Marie A. F. Trinches e João Luiz Raimundo Nogueira*

União da Vitória

Semana iniciou com sol intenso e com chuvas no dia 20 de 8,8 mm e 21 com 2,2 mm. Esta chuva foi benéfica principalmente para as culturas de milho e feijão, que se encontram em fase de frutificação e também para a soja e demais culturas.

Depois da chuva a temperatura apresentou sensível decréscimo podemos, dizer que temos um clima mais agradável nestes últimos dias. Hoje amanheceu com tempo nublado e possibilidade de chuvas.

Equipe técnica: *Luiz Carlos Otomaier e Marcos Marcolin*

Boletins DERAL

Plantio Colheita e Comercialização Mensal

Acesse: https://goo.gl/SdeAzZ

Estimativa de Safras - Mensal

Acesse: https://goo.gl/nqYQ1V


Café

Acesse: https://goo.gl/XZ4HZC

Boletins anteriores: *Acesse: https://goo.gl/IFTgDv*

Condições do Tempo

Sexta-feira se mantém persistente o fluxo de ar quente e úmido em direção ao norte da Argentina, Paraguai e Sul do País. No Paraná a previsão é de que o Sol aparece entre nuvens durante parte do dia, favorecendo maior elevação das temperaturas. Especialmente no decorrer da tarde formam-se núcleos/áreas de instabilidade em função do tempo abafado, e ocorrem chuvas rápidas na maioria das regiões do Estado. As chuvas previstas são bem isoladas; isto é, não atingem todas as cidades de uma mesma região e tampouco todos as áreas de um mesmo município.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Samuel Braun – Atualizado às 07 h 47 min



A sexta-feira amanheceu com muita nebulosidade em boa parte do Paraná. Há registro de chuvas, fracas no geral, entre o oeste, noroeste e o norte pioneiro. Na região de Curitiba e no litoral o Sol aparece com mais força, por isso aquece mais nestes setores em relação aos últimos dias.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

TENDÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO TEMPO PARA O VERÃO 2017/18

No Paraná, historicamente, o verão é uma estação chuvosa. Os sistemas frontais, frentes frias ou quentes, que se deslocam pelo Sul e o Sudeste do País contribuem para instabilizar a atmosfera. Mas não são apenas os sistemas frontais que instabilizam as massas de ar. Há os aglomerados de nuvens que atuam isoladamente ou por vezes alinhados em forma de pequenas linhas de instabilidade. Estes sistemas possuem escalas espaciais menores do que as frentes, no entanto, dependendo da energia disponível no ambiente atmosférico, podem causar chuvas rápidas e que podem vir acompanhadas de trovoadas e/ou rajadas de ventos fortes.

Previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2018.

De acordo com a previsão probabilística disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, observa-se que, para os estados do Sul, ocorre uma grande variabilidade na probabilidade da variação da chuva acumulada para o trimestre. No Paraná, da região central à norte a probabilidade maior se concentra abaixo do normal, ou seja, a probabilidade indica que as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal. Da região central do Paraná aos outros estados da região a predominância é que este acumulado médio fique acima da normal. Para o Sul do Brasil estas probabilidades são baixas, diferente dos valores projetados para o Sudeste brasileiro. Embora com o evento da La Niña bastante consistente o efeito na distribuição das precipitações, para o Sul do Brasil, no trimestre jan – fev – mar, deve se concentrar em valores muito próximos ao valor normal.

Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Assessoria de Imprensa

Agricultura investe R$ 130 milhões em programas sociais

A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento intensificou neste ano as ações de segurança alimentar e nutricional para atender as famílias que estão no campo e na cidade, mas vivem em situação de vulnerabilidade social e nutricional, e que muitas vezes não têm acesso ao alimento.

Fonte e mais informações:

www.agricultura.pr.gov.br