Serviço de Informação Diária

Para acessar mais Fotos, clique aqui

Foto: Colheita de Trigo em Santa Cecília do Pavão Pr – Paulo Roberto A. Miléo



Edição e Publicação:
SEAB/DERAL

13/09/2018

Núcleos Regionais da SEAB



*Clique sobre o nome do Núcleo Regional para ver a jurisdição

Londrina

Em Londrina tempo com boa insolação, temperatura entre 15ºC e 31ºC, umidade relativa em torno de 40% a 84%, segundo Climatempo.
Com a possibilidade de chuva no final da semana, alguns produtores que possuem grandes áreas, pretendem iniciar o plantio de soja, já no dia de hoje (segundo informações).
Com relação a cultura do trigo, algumas áreas já colhidas apresentaram produtividades em torno de 2.000kg/ha, bem abaixo da expectativa inicial que era de 3.000 kg/ha. Neste momento a colheita encontra-se paralisada pela falta de uniformidade dos grãos, (parte dos grãos encontra-se seco e outra ainda não chegou no ponto ideal) isso em função da germinação desuniforme ocorrida no início de implantação da cultura, aliada as condições desfavoráveis no decorrer de seu ciclo.

Colheita do milho segunda safra, caminha para seu final nos próximos dias, restando somente algumas áreas a serem liberadas para colheita, após liberação das seguradoras.

Equipe técnica: *William Arc Meneghel, Pedro Guglielmi Junior, Gilmar Vieira Brene e Luis Morais Neto.*

Pato Branco

Início da manhã com tempo bom, abertura de sol, temperaturas variando de 9ºC a 10°C nas áreas mais altas, e 14ºC a 15º nos municípios com menos altitude. Previsão de instabilidades para o período da tarde, devendo prolongar-se até a semana vindoura.

Safra18/19:
Cultura do milho: iniciaram os plantios efetivamente já na semana anterior, entre os dias 04 e 05 deste. Produtores aproveitaram o tempo bom e como havia previsão de precipitações, aproveitaram para plantar. As chuvas ocorreram, como previsto e foram generosas. A partir desta semana, voltaram com intensidade os plantios, pois abriu o zoneamento e como há previsão de chuvas também, a partir de hoje, foram intensos os trabalhos no meio rural.
Cultura da soja: alguns produtores já iniciaram o plantio da soja, ainda incipiente, solo meio frio, mas querem antecipar plantio para fazer safrinha mais cedo este ano.
Seguem também os plantios de batata, fumo e iniciam plantios de outras pequenas culturas como arroz e mandioca, por exemplo.

Culturas de inverno:
Trigo: continuam as avaliações dos estragos causados pelas geadas. Estas avaliações demonstram estragos pontuais, mais nas baixadas, e áreas isoladas em outros lugares. Mais recentemente os ventos fortes em algumas áreas, causaram acamamento em lavouras espigadas, possíveis aumentos de perdas.
Aveias- Iniciaram-se algumas colheitas, com boas produtividades e excelente qualidade dos grãos colhidos.

Comercialização: cotação da soja na casa dos R$ 81,00 a 82,00/sc e contratos entre R$79,00 a 80,00/sc, dependendo dos prazos de entrega e pagamentos.

Equipe técnica: *Ivano Luiz Carniel e Josemar Bannach Fonseca.*


Palmeira

Hoje tempo parcialmente nublado com sol e temperatura agradável.
A partir das chuvas que recompuseram a umidade no solo, os produtores aceleraram o plantio da safra de verão, apesar de não ser o melhor período tanto no caso do milho, como do feijão, contrariando as orientações da área técnica a implantação teve início, já estando praticamente concluído no caso do milho e feijão com cerca de 80% a 90% plantados. Para se ter uma idéia, o ideal era que o plantio tivesse início a partir de 15 de setembro, no entanto hoje dia 13 ele já está praticamente concluído, parece que a cada ano o produtor está antecipando os plantios, pensando numa segunda safra. Essa pressa também é sentida no caso da soja, como estima-se que cerca de 40% do plantio é de variedade precoce, alguns produtores já efetuam a semeadura (1%). Se ocorrer alguma queda acentuada de temperatura, visto ainda estarmos no inverno, essas áreas podem sofrer danos irreparáveis. Em relação a dessecação das áreas de aveia destinadas ao plantio da soja, estima-se que cerca de 60% já foram concluídas, pois o ideal é que aguarde-se cerca de 30 dias do dessecamento quando a palha já estará podre facilitando o corte. O milho plantado está na germinação inicial, sendo um pouco mais demorada devido as temperaturas ainda baixas. Em relação ao feijão, este está em desenvolvimento vegetativo com bom aspecto.
As lavouras de inverno estão entrando na fase reprodutiva, com a terceira aplicação de fungicida e inseticida já sendo realizada, para o controle de oídio (baixa incidência agora), ferrugem (presente mais no baixeiro) e mancha foliar com um nível de incidência médio, com bom controle. Em níveis insignificantes começa a surgir alguma coisa de giberela nas espigas, devendo os produtores fazerem uma quarta aplicação de defensivos visando principalmente o controle dessa doença. Como já relatamos anteriormente, as condições das lavouras de inverno estão bem melhores após as chuvas, com uma boa produção ainda sendo esperada.
Condições das pastagens, tanto nativas como plantadas, bem melhores também com ganho de desenvolvimento. Os pomares também apresentam boas condições.

Equipe técnica: Carlos Roberto Osternack

Condições do Tempo

Uma frente fria se organizou, em sua porção continental, entre o nordeste da Argentina e o sul do Paraguai. À dianteira desta frente fria pequenas linhas de instabilidade se organizam e provocam pancadas de chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos moderadas e raios. No Paraná o dia amanhece com chuviscos intermitentes na faixa leste/sudeste que vai da Serra do Mar às praias e temperaturas elevadas, sem chuvas nas demais regiões porém, devido à aproximação das áreas chuvosas citadas, há a previsão para que pancadas de chuvas, com trovoadas, atinjam o Sudoeste, oeste e parte do sul.




Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Palavra do meteorologista

Cezar Gonçalves Duquia – Atualizado às 08 h 22 min

As áreas com maiores taxas de instabilidade do ar e que se desenvolvem à dianteira da frente fria já atingem setores da fronteira sudoeste e sul da região oeste do Paraná. Na figura estão destacadas (coloridas) as áreas e a direção preferencial de deslocamento das chuvas.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br

Geadas

Sexta, 14 de Setembro de 2018

A sexta-feira não apresentará condições atmosféricas favoráveis para a formação de geadas no Paraná.



Fonte e mais informações:

www.simepar.br